

# 108 年新北市男、女性蓄意自我傷害（自殺）概況

新北市政府衛生局 會計室


## 一、前言

自 2003 年開始，世界衛生組織和國際自殺預防協會把每年 9 月 10 日確定為「世界預防自殺日」，以幫助公眾了解誘發自殺行為的危險因素，增強人們對不良生活事件的應對能力，預防自殺行為。而蓄意自我傷害（自殺）為新北市十大死因中之一，本文藉由觀察兩性選擇自殺方式之差異、年齡別自殺死亡率等資訊，了解須加強關懷之主要族群，以利強化市民精神疾病照護、心理健康及自殺防治工作，期有效降低新北市自殺死亡率。

## 二、觀察 108 年男、女性蓄意自我傷害（自殺）人數

由 108 年新北市十大死因中可發現，蓄意自我傷害（自殺）皆為男、女性的第 8 大死因。進一步分析相關數據，新北市 108 年蓄意自我傷害（自殺）人數共 632 人，其中男性為 407 人(約占 64.40%)，而女性則為 225 人(約占 35.60%)。

若以標準化死亡率觀察，新北市 108 年蓄意自我傷害（自殺）標準化死亡率為每十萬人口 12.1 人；若以性別分析，男性標準化死亡率為每十萬人口 16.2 人，女性則為每十萬人口 8.3 人。再進一步以年齡層分析，男性以 45-64 歲的自殺人數最多，25-44 歲次之，分別為 149 人、136 人；女性以 45-64 歲的自殺人數最多，25-44 歲次之，分別為 91 人、62 人。而這兩組年齡別加總的自殺人數，約占全市自殺人數的 69.30%，如表一、圖一所示。



圖一 新北市 108 年男、女性蓄意自我傷害（自殺）人數

資料來源：衛生福利部統計處。


表一 新北市 108 年男、女性蓄意自我傷害 ( 自殺 ) 人數

年齡別(歲)	性別	死亡人數 ( 人 )	百分比(%)
0-4	計	-	-
	男	-	
	女	-	
5-14	計	2	0.32%
	男	-	
	女	2	
15-24	計	40	6.33%
	男	27	
	女	13	
25-44	計	198	31.33%
	男	136	
	女	62	
45-64	計	240	37.97%
	男	149	
	女	91	
65-74	計	90	14.24%
	男	54	
	女	36	
75-84	計	48	7.59%
	男	32	
	女	16	
85+	計	14	2.22%
	男	9	
	女	5	
總計	計	632	100%
	男	407	
	女	225	

資料來源：衛生福利部統計處。

### 三、觀察歷年男、女性蓄意自我傷害（自殺）總人數

觀察新北市 98 年至 108 年男、女性蓄意自我傷害（自殺）總人數，其中 98 年至 101 年，男、女性自殺死亡總人數均呈下降趨勢，又以男性下滑走勢較為明顯，而 101 年至 104 年變動較為平緩，但 105 年後至 106 年男性自殺死亡總人數又呈微下降趨勢，女性自殺死亡總人數則呈現上升趨勢，如圖二所示。




圖二 新北市 98 至 108 年男、女性蓄意自我傷害（自殺）總人數

資料來源：衛生福利部統計處。

### 四、108 年男、女自殺方式分析

由 108 年男、女自殺方式的差異加以分析，男性以「吊死、勒死及窒息」方式自殺人數 144 人為最多，而以「以氣體或蒸汽」方式自殺 131 人次之，前兩大自殺方式人數即占男性自殺總人數的 67.57%；女性則以「吊死、勒死及窒息」方式自殺人數 68 人為最多，而以「高處跳下」方式自殺 67 人次之，前兩大自殺方式人數即占女性自殺總人數的 60.00%，如圖三所示。



圖三 新北市 108 年男、女性蓄意自我傷害 ( 自殺 ) 方式分析與人數

資料來源：衛生福利部統計處。

## 五、結論

專家研究認為，對有自我傷害意圖和行為的人實行三級預防，可有效改變或提升他們的生活與生存欲望，擺脫無望感，有效降低再次傷害風險。

初級預防：加強精神心理健康教育，營造關愛生命、尊重生命等良好氛圍，降低傷害風險。地鐵安全門、高樓大廈與外界相連的窗等人性化設計、農藥高度使用地區的藥品合理管理，在這方面都可發揮積極作用。

二級預防：降低那些有可能導致傷害或自殺行為出現的種種因素或條件，如及時治療精神心理障礙者，關注患嚴重軀體疾病、喪失基本功能者，對遭遇重大創傷、生活事件的人，耐心勸導。善於發現可能的傷害線索，做好疏導工作，是二級預防的關鍵。

三級預防：高風險人群的心理干預與服務是重中之重，針對已經發生傷害行為的人、自殺未遂者實施服務，可有效降低再次傷害風險。家屬、傷害者本人要正確看待傷害現象，不要把很自然的疾病看作是一種「家醜」。尤其是家屬，要引導、支持當事人主動就醫，尋求幫助，接納病情及再自殺風險評估，切莫忌諱就醫。

有研究顯示，37%的自殺未遂者自殺前考慮自殺的時間不超過 5 分鐘，60%考慮自殺的時間不超過 2 小時。對於這類衝動性自殺的人群，外界的及時干預往往有很好的效果。從社會的層面來說，成立專門機構進行專業干預，也是防範措施之一。

藉由 108 年的數據，我們發現應該多關懷 25-64 歲的市民。預防自殺是我們每一個人的責任！